



PREVENZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL FUMO PASSIVO IN ETA' PEDIATRICA: IL PROGETTO "VOGLIO CRESCERE LONTANO DAL FUMO" DELL'ASL 4 "CHIAVARESE"

Trucchi C*, Zoppi G**, Carpi A**, Ferrari Bravo M**, Chiesa S**, Gesmundo D**, Assereto C**

*Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) – Università di Genova;

**Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) 4 "Chiavarese"



CASTELBRANDOCINQUE

CONVEGNO NAZIONALE


ORGANIZZARE RETI PREVENTIVE
IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE QUALE HUB
DI PERCORSI INTERNI ED ESTERNI
ALL'AZIENDA SANITARIA



CASTELBRANDO
CISON DI VALMARINO (TREVISO)
26-27 MAGGIO 2011

Obiettivi

- ▶ Valutare l'abitudine al fumo dei genitori dei nuovi nati afferenti agli ambulatori vaccinali dell'A.S.L. 4 Chiavarese durante le prime sedute vaccinali.
- ▶ Sensibilizzare i genitori sui rischi dell'esposizione al fumo passivo per la salute del bambino.
- ▶ Valutare l'efficacia dell'intervento in occasione della terza seduta vaccinale.



Metodi

- ▶ Somministrazione del questionario.
- ▶ Breve *counselling* (brochure).
- ▶ Per i genitori fumatori informazioni sul Centro Antifumo dell'A.S.L. 4 Chiavarese.

VOGLIO CRESCERE LONTANO DAL FUMO?

QUESTIONARIO

Gentile genitore, Le chiediamo alcuni minuti del Suo tempo per la compilazione del presente questionario. Questa scheda, redatta dalla S.C. Igiene e Sanità Pubblica e dalla S.C. Pneumologia dell'ASL 4 Chiavarese, ha l'obiettivo di sensibilizzare i genitori riguardo all'importanza di non esporre i propri bambini al fumo di sigaretta. Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. La informiamo, pertanto, che i dati saranno raccolti in forma anonima e verranno utilizzati solo a scopo statistico, in forma aggregata.

Test per il calcolo del livello del grado di dipendenza da nicotina

Quanto tempo dopo il risveglio accende la prima sigaretta?	Entro 5 minuti	3
	Dopo 6-30 minuti	2
	Dopo 31-60 minuti	1
	Dopo 60 minuti	0
Trova difficile astenersi dal fumare nei luoghi dove è vietato?	Sì	1
	No	0
A quale sigaretta farebbe più fatica a rinunciare?	la prima del mattino	1
	qualsiasi	0
Quante sigarette fuma al giorno?	10 o meno	0
	da 11 a 20	1
	da 21 a 30	2
	31 o più	3
Fuma con maggiore frequenza nelle prime ore dopo il risveglio che durante il resto della giornata?	Sì	1
	No	0
Fuma quando è costretto a letto da qualche malattia intercorrente?	Sì	1
	No	0
Qual è il contenuto di nicotina delle sigarette che fuma?	Meno di 0,8 mg	0
	Da 0,8 a 1,5 mg	1
	Più di 1,5 mg	2
Aspira il fumo?	mai	0
	a volte	1
	sempre	2
PUNTEGGIO TOTALE		

da 0 a 2	Grado di dipendenza molto basso
da 3 a 4	Grado di dipendenza basso
da 5 a 6	Grado di dipendenza medio
da 7 a 8	Grado di dipendenza alto
da 9 a più	Grado di dipendenza molto alto


Interpretazione del test

Risultati 1


Età dei genitori intervistati

	Fumatori		Non fumatori	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Range	29-56	18-39	26-51	20-55
Media	38.14	29.89	36.50	32.81
Mediana	36	31	36	33

Nazionalità degli intervistati




Livello di istruzione degli intervistati




Risultati 2

Abitudine al fumo dei genitori dei nuovi nati



Conoscenze degli intervistati relative alla relazione esistente tra il fumo passivo ed alcune patologie pediatriche



Conclusioni

- ▶ I risultati ottenuti ci consentono, allo stato attuale, di conoscere le dimensioni del problema fumo tra i genitori dei nuovi nati.
- ▶ Il reclutamento degli stessi soggetti in occasione della terza seduta vaccinale ci consentirà di valutare l'efficacia dell'intervento svolto.